Nº109| 30/05/2024

BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO



Figura 1: Mapa de Distribuição das Plataformas de Coleta de Dados

Os dados de níveis dos rios entre os dias **29 a 30/05/24** apontam que:

Rio Madeira (Humaitá): subiu 144 cm, atingindo a cota de **1693 cm**, em relação ao ano anterior está **181 cm** abaixo.

Rio Solimões (Manacapuru): subiu 2 cm, atingindo a cota de **1738 cm**, em relação ao ano anterior está **163 cm** abaixo, cabe ressaltar que a cota de referência do nível da cheia encontra-se em **alerta**.

Rio Purus (Lábrea): **desceu 24 cm**, atingindo a cota de **1326 cm**, em relação ao ano anterior está **621 cm** abaixo.

Rio Negro (Curicuriari): manteve a cota de **1305 cm**, em relação ao ano anterior está **103 cm** acima, cabe ressaltar que a cota de referência do nível da cheia encontra-se em **emergência**.

Rio Solimões (Tefé): subiu 1 cm, atingindo a cota de **1217 cm**, em relação ao ano anterior está **131 cm** abaixo.

Rio Solimões (Tabatinga): desceu 5 cm, atingindo a cota de **1014 cm**, em relação ao ano anterior está **123 cm** abaixo.

Rio Juruá (Eirunepé): atingiu a cota de 622 cm.



O Rio Amazonas em Itacoatiara: subiu 2 cm, atingindo a cota de **1220 cm**, em relação ao ano anterior está **157 cm** abaixo.

Em **30 de maio** (**Cheia Histórica/2009**), o rio estava com **1592 cm**. Este ano o Rio Amazonas está **372 cm** abaixo em relação ao mesmo período em **2009**.

O **cotagrama 1** mostra o comportamento do **Rio Amazonas** em uma determinada série de anos.



O Rio Negro em Manaus: subiu 4 cm, atingindo a cota de **2640 cm**, em relação ao ano anterior está **170 cm** abaixo, cabe ressaltar que a cota de referência do nível da cheia encontra-se em **atenção**.

Em **30 de maio (Cheia Histórica/2021),** o rio estava com **2997 cm**. Este ano o Rio Negro está **357 cm** abaixo em relação ao mesmo período em **2021**.

O **cotagrama 2** mostra o comportamento do **Rio Negro** em uma determinada série de anos.

Tabela 01: Informações de cotas nas principais calhas dos rios.

Rio	Localização	Cota (cm) Maio/2023		Cota Atual (cm) Maio/2024		Variação (cm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA (cm) CHEIA			COTAS (cm)	
		SEG 29	TER 30	QUA 29	QUI 30	2024	2023/2024	ATENÇÃO	ALERTA	EMERGÊNCIA	Mín.	Máx
Rio Negro	Manaus	2807	2810	2636	2640	4	-170	2600	2700	2900	1270	3002
	Curicuriari(SGC)	1196	1202	1305	1305	0	103	1025	1053	1091	504	1525
Rio Solimões	Tabatinga	1142	1137	1019	1014	-5	-123	1171	1218	1253	86	1382
	Tefé-Missões	1346	1348	1216	1217	1	-131	1253	1337	1436	0,08	1602
	Manacapuru	1885	1901	1736	1738	2	-163	1490	1590	1960	495	2078
Rio Amazonas	Itacoatiara	1376	1377	1218	1220	2	-157	1300	1400	1440	91	2344
Rio Madeira	Humaitá	1866	1874	1549	1693	144	-181	2200	2250	2350	88	2563
Rio Purus	Lábrea	1960	1947	1350	1326	-24	-621	2000	2050	2100	130	2179
Rio Juruá	Eirunepé-Montante	SL	SL	SL	622	-	-	1600	1650	1700	143	1731

Nº 109| 30/05/2024

BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO



Figura 2: Prognóstico semanal de anomalias de precipitação Fonte: http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/mchen/CFSv2FCST/weekly/

Segundo o CPC/NOAA (Climate Prediction Center – National Oceanic and Atmospheric Administration), o prognóstico de anomalias de precipitação entre os dias 25/04 e 01/05/2024 (Figura 3 – esquerda), previsão de déficit (laranja) de precipitação em relação a climatologia do período, sobre as bacias do Aripuanã, Beni, Coari, Guaporé, Içá, Japurá, baixo Javari, Ji-Paraná, baixo Juruá, Madeira, Mamoré, Napo, Purus, Ucayali e curso principal do Amazonas em território peruano. Chuvas acima (azul) da climatologia podem ocorrer sobre as bacias do Branco e do Negro. Demais áreas com previsão de chuvas próximas (branco) da climatologia do período.

A Figura 2 – direita, apresenta o prognóstico do CPC/NOAA para o período 02 a 08/05/2024 (Figura 3 – direita), previsão de deficit (laranja) de precipitação em relação a climatologia do período no centro e norte da área monitorada, predominando sobre as bacias do Branco Coari, Içá, Japurá, baixo Jutaí, baixo Madeira, baixo Marañon, bacias do Napo, Negro, baixo Purus, Tefé e curso principal do Solimões, demais áreas com previsão de chuvas próximas (branco) da climatologia do período.



Figura 3: (a) Anomalia Categorizada e (b) chuva acumulada (mm) para fevereiro de 2024 Dados do MERGE/CPTEC processados pelo CENSIPAM.

A Figura 3 – apresenta a anomalia categorizada (a) e o acumulado de precipitação para fevereiro/2024 (b). As categorias "Seco" ou "Muito Seco" predominaram no norte e sudoeste da Amazônia Legal. As categorias "Chuvoso" e "Muito Chuvoso" ocorreram no Maranhão, Acre, sul e sudoeste do Amazonas, sudoeste, leste e nordeste do Pará, sul e norte do Tocantins, norte de Rondônia, além dos setores central e norte do Mato Grosso. As anomalias de precipitação associadas com o déficit de precipitação no norte da Amazônia Legal responderam aos efeitos dinâmicos da atuação do El Niño. Por outro lado, os excessos de chuva na Amazônia Oriental foram favorecidos pela atividade da Zona de Convergência intertropical sobre a região, que teve seu posicionamento e organização influenciados pelas anomalias positivas de TSM no Atlântico Tropical. As demais anomalias de precipitação na Amazônia Legal estiveram relacionadas com a influência de outros mecanismos atmosféricos e/ou oceânicos, que influenciaram na intensidade e/ou posicionamento dos sistemas meteorológicos de escala sinótica e de mesoescala, que geraram precipitação nesta época do ano. Os maiores volumes de precipitação foram registrados em pontos do Acre, sul-sudoeste do Amazonas, centro do Mato Grosso e no Marajó (Pará), com acumulados superiores a 450 mm. Os menores acumulados ocorreram em Roraima, com totais pluviométricos abaixo de 10 mm.



Figura 4: Climatologia da precipitação máxima (painel superior e mínima (painel inferior) para os meses de abril a junho (mm).

A caracterização climática da precipitação é tomada por base na técnica dos Quantis, definidos pelas categorias: muito seco (0 - 15%), seco (15 – 35%), normal (35 – 65%), chuvoso (65 – 85%) e muito chuvoso (85 – 100%), de tal forma que o mínimo climatológico considerado normal é dado pelo quantil 35% e o máximo pelo quantil 65%. A base de dados é composta pela estimativa de precipitação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/ GPM/DAILY/ no período de 2001/2020. Os mapas climatológicos de precipitação para o trimestre de abril, maio e junho são mostrados na **Figura 4**.

No início do trimestre, os máximos de chuva apresentam-se na direção zonal, favorecidos pela ZCIT que está localizada mais ao sul, abrangendo a região nordeste e central da Amazônia, o norte dos estados do Amazonas, Pará e Maranhão, no Amapá e sul de Roraima. Em maio, inicia na porção sul da Amazônia, particularmente nos estados do Tocantins e Mato Grosso, a estação seca, com considerável redução na precipitação. Grande parte da região encerra o último mês do trimestre com índices pluviométricos inferiores a 50 mm, quando a massa de ar seco já está estabelecida no Brasil Central. O trimestre também é marcado pelos eventos de friagem no sul e oeste da Amazônia.