

# BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO




Figura 1: Mapa de Distribuição das Plataformas de Coleta de Dados

Os dados de níveis dos rios entre os dias 22 a 24/06/24 apontam que:

**Rio Madeira (Humaitá): subiu 15 cm**, atingindo a cota de **1427 cm**, em relação ao ano anterior está **224 cm** abaixo.

**Rio Solimões (Manacapuru): desceu 1 cm**, atingindo a cota de **1764 cm**, em relação ao ano anterior está **151 cm** abaixo, cabe ressaltar que a cota de referência do nível da cheia encontra-se em **alerta**.

**Rio Purus (Lábrea): desceu 14 cm**, atingindo a cota de **762 cm**, em relação ao ano anterior está **737 cm** abaixo.


**Rio Negro (Curicuriari): subiu 5 cm**, atingindo a cota de **1365 cm**, em relação ao ano anterior está **188 cm** acima, cabe ressaltar que a cota de referência do nível da cheia encontra-se em **emergência**.

**Rio Solimões (Tefé): desceu 4 cm**, atingindo a cota de **1215 cm**, em relação ao ano anterior está **153 cm** abaixo.

**Rio Solimões (Tabatinga): desceu 1 cm**, atingindo a cota de **671 cm**, em relação ao ano anterior está **298 cm** abaixo.

**Rio Juruá (Eirunepé): subiu 5 cm**, atingindo a cota de **332 cm**.

COTAGRAMA 1: RIO AMAZONAS - ITACOATIARA  
ESTÇÃO - 16030000




O Rio Amazonas em Itacoatiara: **desceu 1 cm**, atingindo a cota de **1220 cm**, em relação ao ano anterior está **141 cm** abaixo.

Em 24 de junho (Cheia Histórica/2009), o rio estava com **1604 cm**. Este ano o Rio Amazonas está **384 cm** abaixo em relação ao mesmo período em 2009.

O cotograma 1 mostra o comportamento do Rio Amazonas em uma determinada série de anos.

COTAGRAMA 2: RIO NEGRO - MANAUS  
ESTÇÃO - 14990000  
Maior cheia em 26/06/2021, com cota de 3001 cm.



O Rio Negro em Manaus: **manteve** a cota de **2682 cm**, em relação ao ano anterior está **134 cm** abaixo, cabe ressaltar que a cota de referência do nível da cheia encontra-se em **atenção**.

Em 24 de junho (Cheia Histórica/2021), o rio estava com **3001 cm**. Este ano o Rio Negro está **319 cm** abaixo em relação ao mesmo período em 2021.

O cotograma 2 mostra o comportamento do Rio Negro em uma determinada série de anos.


Tabela 01: Informações de cotas nas principais calhas dos rios.

Rio	Localização	Cota (cm) Junho/2023			Cota Atual (cm) Junho/2024			Variação (cm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA CHEIA			COTAS (cm)	
		QUI 22	SEX 23	SAB 24	SAB 22	DOM 23	SEG 24	2024	2023/2024	ATENÇÃO	ALERTA	EMERGÊNCIA	Mín.	Máx.
Rio Negro	Manaus	2819	2818	2816	2683	2682	2682	0	-134	2600	2700	2900	1270	3002
	Curicuriari(SGC)	1198	1187	1177	1355	1360	1365	5	188	1025	1053	1091	504	1525
Rio Solimões	Tabatinga	1001	982	969	674	672	671	-1	-298	1171	1218	1253	86	1382
	Manacapuru	1370	1368	1368	1225	1219	1215	-4	-153	1253	1337	1436	0,08	1602
Rio Amazonas	Itacoatiara	1364	1362	1361	1223	1221	1220	-1	-141	1300	1400	1440	91	2344
Rio Madeira	Humaitá	1676	1678	1651	1145	1412	1427	15	-224	2200	2250	2350	88	2563
Rio Purus	Lábrea	1551	1525	1499	791	776	762	-14	-737	2000	2050	2100	130	2179
Rio Juruá	Eirunepé-Montante	SL	SL	SL	326	327	332	5	-	1600	1650	1700	143	1731

ANOMALIA DE CHUVA PREVISTA modelo CFS v2 CPC/NCEP/NOAA

Período: 25/04/2024 – 01/05/2024

Período: 02/05/2024 – 08/05/2024



1	BH Aripuanã
2	BH Beni
3	BH Branco
4	BH Coari
5	BH Guaporé
6	BH Içá
7	BH Japurá
8	BH Javari
9	BH Ji-Paraná
10	BH Juruá
11	BH Jutai
12	BH Madeira
13	BH Mamoré
14	BH Maraion
15	BH Napo
16	BH Negro
17	BH Purus
18	BH Solimões
19	BH Tefé
20	BH Ucayali

Figura 2: Prognóstico semanal de anomalias de precipitação Fonte:

<http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/mchen/CFSv2FCST/weekly/>

Segundo o CPC/NOAA (Climate Prediction Center – National Oceanic and Atmospheric Administration), o prognóstico de anomalias de precipitação entre os dias 25/04 e 01/05/2024 (Figura 3 – esquerda), previsão de déficit (laranja) de precipitação em relação a climatologia do período, sobre as bacias do Aripuanã, Beni, Coari, Guaporé, Içá, Japurá, baixo Javari, Ji-Paraná, baixo Juruá, Madeira, Mamoré, Napo, Purus, Ucayali e curso principal do Amazonas em território peruano. Chuvas acima (azul) da climatologia podem ocorrer sobre as bacias do Branco e do Negro. Demais áreas com previsão de chuvas próximas (branco) da climatologia do período.

A Figura 2 – direita, apresenta o prognóstico do CPC/NOAA para o período 02 a 08/05/2024 (Figura 3 – direita), previsão de déficit (laranja) de precipitação em relação a climatologia do período no centro e norte da área monitorada, predominando sobre as bacias do Branco Coari, Içá, Japurá, baixo Jutai, baixo Madeira, baixo Maraion, bacias do Napo, Negro, baixo Purus, Tefé e curso principal do Solimões, demais áreas com previsão de chuvas próximas (branco) da climatologia do período.

FEVEREIRO 2024 – MERGE




Figura 3: (a) Anomalia Categorizada e (b) chuva acumulada (mm) para fevereiro de 2024 Dados do MERGE/CPTEC processados pelo CENSIPAM.

A Figura 3 – apresenta a anomalia categorizada (a) e o acumulado de precipitação para fevereiro/2024 (b). As categorias “Seco” ou “Muito Seco” predominaram no norte e sudoeste da Amazônia Legal. As categorias “Chuvoso” e “Muito Chuvoso” ocorreram no Maranhão, Acre, sul e sudoeste do Amazonas, sudoeste, leste e nordeste do Pará, sul e norte do Tocantins, norte de Rondônia, além dos setores central e norte do Mato Grosso. As anomalias de precipitação associadas com o déficit de precipitação no norte da Amazônia Legal responderam aos efeitos dinâmicos da atuação do El Niño. Por outro lado, os excessos de chuva na Amazônia Oriental foram favorecidos pela atividade da Zona de Convergência intertropical sobre a região, que teve seu posicionamento e organização influenciados pelas anomalias positivas de TSM no Atlântico Tropical. As demais anomalias de precipitação na Amazônia Legal estiveram relacionadas com a influência de outros mecanismos atmosféricos e/ou oceânicos, que influenciaram na intensidade e/ou posicionamento dos sistemas meteorológicos de escala sinótica e de mesoescala, que geraram precipitação nesta época do ano. Os maiores volumes de precipitação foram registrados em pontos do Acre, sul-sudoeste do Amazonas, centro do Mato Grosso e no Marajó (Pará), com acumulados superiores a 450 mm. Os menores acumulados ocorreram em Roraima, com totais pluviométricos abaixo de 10 mm.




Figura 4: Climatologia da precipitação máxima (painel superior) e mínima (painel inferior) para os meses de abril a junho (mm).

A caracterização climática da precipitação é tomada por base na técnica dos Quantis, definidos pelas categorias: muito seco (0 - 15%), seco (15 - 35%), normal (35 - 65%), chuvoso (65 - 85%) e muito chuvoso (85 - 100%), de tal forma que o mínimo climatológico considerado normal é dado pelo quantil 35% e o máximo pelo quantil 65%. A base de dados é composta pela estimativa de precipitação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em <http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/GPM/DAILY/> no período de 2001/2020. Os mapas climatológicos de precipitação para o trimestre de abril, maio e junho são mostrados na Figura 4.

No início do trimestre, os máximos de chuva apresentam-se na direção zonal, favorecidos pela ZCIT que está localizada mais ao sul, abrangendo a região nordeste e central da Amazônia, o norte dos estados do Amazonas, Pará e Maranhão, no Amapá e sul de Roraima. Em maio, inicia na porção sul da Amazônia, particularmente nos estados do Tocantins e Mato Grosso, a estação seca, com considerável redução na precipitação. Grande parte da região encerra o último mês do trimestre com índices pluviométricos inferiores a 50 mm, quando a massa de ar seco já está estabelecida no Brasil Central. O trimestre também é marcado pelos eventos de friagem no sul e oeste da Amazônia.