




Figura 1: Mapa de Distribuição das Plataformas de Coleta de Dados

Os dados de níveis dos rios entre os dias **30 a 01/10/24** apontam que:

Rio Madeira (Humaitá): não apresentou dados.

Rio Solimões (Manacapuru): **desceu 18 cm**, atingindo a cota de **282 cm**, em relação ao ano anterior está **290 cm** abaixo.

Rio Purus (Lábrea): **desceu 1 cm**, atingindo a cota de **332 cm**, em relação ao ano anterior está **135 cm** abaixo.

Rio Negro (Curicuriari): **subiu 30 cm**, atingindo a cota de **804 cm**, em relação ao ano anterior está **70 cm** acima.

Rio Solimões (Tefé): **desceu 31 cm**, atingindo a cota de **373 cm**.

Rio Amazonas (Itacoatiara): **desceu 11 cm**, atingindo a cota de **61 cm**, em relação ao ano anterior está **233 cm** abaixo.

Rio Juruá (Eirunepé): **manteve** a cota de **271 cm**, em relação ao ano anterior está **7 cm** abaixo.

O Rio Solimões em Tabatinga: **subiu 11 cm**, atingindo a cota de **-219 cm**, em relação ao ano anterior está **220 cm** abaixo.

Em **01 de outubro (Cheia Histórica/1999)**, o rio estava com **334 cm**. Este ano o Rio Solimões está **-115 cm** abaixo em relação ao mesmo período em **1999**.

O **cotograma 1** mostra o comportamento do **Rio Solimões** em uma determinada série de anos.

O Rio Negro em Manaus: **desceu 14 cm**, atingindo a cota de **1305 cm**, em relação ao ano anterior está **241 cm** abaixo.

Em **01 de outubro (Cheia Histórica/2021)**, o rio estava com **2262 cm**. Este ano o Rio Negro está **957 cm** abaixo em relação ao mesmo período em **2021**.

O **cotograma 2** mostra o comportamento do **Rio Negro** em uma determinada série de anos.

Tabela 01: Informações de cotas nas principais calhas dos rios.

Rio	Localização	Cota (cm) Set - Out/2023		Cota Atual (cm) Set - Out/2024		Variação (cm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA (cm) CHEIA			COTAS (cm)	
		SAB 30	DOM 01	SEG 30	TER 01	2024	2023/2024	ATENÇÃO	ALERTA	EMERGÊNCIA	Mín.	Máx.
Rio Negro	Manaus	1566	1546	1319	1305	-14	-241	2600	2700	2900	1270	3002
	Curicuriari(SGC)	SL	734	774	804	30	70	1025	1053	1091	504	1525
Rio Solimões	Tabatinga	14	1	-230	-219	11	-220	1171	1218	1253	-197	1382
	Tefé-Missões	SL	SL	404	373	-31	-	1253	1337	1436	0,08	1602
	Manacapuru	587	572	300	282	-18	-290	1490	1590	1960	495	2078
Rio Amazonas	Itacoatiara	313	294	72	61	-11	-233	1300	1400	1440	91	2344
Rio Madeira	Humaitá	912	904	800	SL	-	-	2200	2250	2350	88	2563
Rio Purus	Lábrea	470	467	333	332	-1	-135	2000	2050	2100	130	2179
Rio Juruá	Eirunepé-Montante	279	278	271	271	0	-7	1600	1650	1700	143	1731




Figura 2: Anomalias de TSM (°C) agosto de 2024. Dados do CPC/NCEP processados pelo Censipam

A Figura 2 – mostra a distribuição das anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) de agosto de 2024. No leste do Pacífico equatorial foram notadas áreas com águas mais frias que a média, enquanto nas demais áreas do Pacífico equatorial, as TSM variaram entre neutras e anormalmente aquecidas, esta última principalmente no setor oeste. Essa distribuição de anomalias de TSM no Pacífico representa uma condição de neutralidade em relação ao El Niño Oscilação Sul. No Atlântico tropical norte, persistiram as anomalias positivas de TSM, enquanto na bacia sul, predominou a condição de neutralidade. Esse padrão de TSM no Atlântico contribuiu para a ocorrência de estiagem na Amazônia.




Figura 3: (a) Anomalia Categorizada e (b) chuva acumulada (mm) para agosto de 2024 Dados do MERGE/CPTec processados pelo CENSIPAM.

A Figura 3 – apresenta a anomalia categorizada (a) e o acumulado de precipitação para agosto de 2024 (b). As categorias “Chuvoso” e “Muito Chuvoso” ocorreram no norte de Roraima, sul do Maranhão, noroeste e sudeste do Pará, além de pontos do Tocantins, Mato Grosso e Amazonas. As anomalias no extremo norte, foram associadas ao aquecimento do Atlântico norte, que potencializou a atuação da Zona de Convergência Intertropical; e na parte sul ocorreram pela influência de sistemas frontais que passaram pelo Atlântico Sul e potencializaram a formação de nuvens mais robustas em pontos da Amazônia. Contudo, devido ao baixo valor climatológico esperado neste período do ano em todo o sul da região, um pequeno volume de chuva pode representar anomalias de excesso de precipitação. As categorias “Seco” ou “Muito Seco” predominaram na maior parte da Amazônia Legal, em resposta à modificação da circulação promovida pelas anomalias de TSM do Atlântico, que desfavoreceu a ocorrência de precipitação.




Figura 4: Climatologia da precipitação máxima (painel superior e mínima (painel inferior) para os meses de outubro a dezembro (mm). A escala dos valores de precipitação é dada em mm. Dados do MERGE/CPTec processados pelo CENSIPAM.

A caracterização climática da precipitação é baseada na técnica dos quantis, definidos pelas categorias: muito seco (0–15%), seco (15–35%), normal (35–65%), chuvoso (65–85%) e muito chuvoso (85–100%). Dessa forma, o mínimo climatológico considerado normal é dado pelo quantil de 35% e o máximo pelo quantil de 65%. A base de dados é composta pela estimativa de precipitação do MERGE no período de 2001 a 2020 disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/GP_M/DAILY/. Os mapas climatológicos de precipitação para outubro, novembro e dezembro (Figura 5) indicam que no trimestre ocorre o final da estação seca e início da chuvosa em grande parte da região (exceto para o norte e nordeste), cujos máximos de chuva concentram-se em uma área com orientação noroeste-sudeste, aumentando de maneira gradual a precipitação no Amazonas, Rondônia, sul do Pará e norte do Mato Grosso, principalmente no final do trimestre. Os mínimos de precipitação (abaixo de 100 mm) ocorrem no nordeste da Amazônia, com precipitação inferior a 50 mm mensais no extremo norte do Maranhão. Outra característica importante da precipitação da região neste trimestre é a ocorrência de pancadas fortes de chuva, caracterizando o período de transição e início da estação chuvosa.